

Avertissements agricoles

DLP 13 - 5 - 85507259

Publication périodique

ÉDITION "GRANDES CULTURES"

ISSN 0757 4029

BULLETIN TECHNIQUE N° 12

10 MAI 1985

COLZA : Sclerotinia : les pluies du début de la semaine ont pu provoquer des contaminations.

BLE : Montée de la Septoriose. 20% des parcelles atteintes sur 3^e feuille.

- COLZA -

SCLEROTINIA :

● Des apothécies du champignon ont été observées dans le Cher, et la chute des pétales est maintenant bien engagée.

● La période de pluie du 6 au 8 Mai a probablement permis des contaminations en zones à risques définies dans nos précédents messages (bulletin du 18 Avril, P. 2 et bulletin du 2 Mai, P. 1).

→ A la réception du bulletin, il sera trop tard pour traiter efficacement sur les contaminations déjà effectuées, plus de 3 jours s'étant écoulés entre le début de contamination et l'éventuel traitement.

CHARANÇON DES SILIQUES :

● Activité nulle à très modérée.

→ Pas de traitement dans l'immédiat.

● Attention au prochain réchauffement.

→ Seuil d'intervention, produits : se reporter aux bulletins précédents.

Remarques le traitement par tracteur étant désormais impossible, il faudra envisager un traitement aérien en cas d'arrivées massives de cet insecte sur les cultures.
Les insecticides étant peu rémanents sur colza à cette époque (moins d'1 semaine), n'intervenir qu'en présence d'au moins 1 charançon pour 5 plantes.

- TOURNESOL -

PROBLÈMES DE LEVÉE :

Divers accidents de levée sont actuellement constatés :

● Destruction de l'amande du grain dans le sol par de petites limaces noires terricoles.

Abonnement annuel : 100 F - Chèque à l'ordre du Régisseur de Recettes D.D.A. Loiret à envoyer à l'adresse ci-dessous.

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

93, Rue de Curambourg - B.P. 210

45403 FLEURY-LES-AUBRAIS CEDEX - Tél. (38) 86.36.24

ÉDITION DE LA STATION "CENTRE"

(Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret)

Imprimerie de la Station "Centre"

Le Directeur-Gérant : A. SIMONIN

CPPAP N° 530 AD



P 18

→ Aucune lutte efficace actuellement possible. Des études sont en cours pour voir l'intérêt d'une localisation d'herbicide dans la raie de semis.

- Des dégâts de limaces grises au moment de la levée ou sur plantules.

→ Ne pas attendre pour réagir. Poser des pièges (granulés dispersés sous un sac ou une tuile dans les endroits les plus frais de la parcelle) et traitez si vous trouvez des limaces mortes dans les pièges.

- Dégâts d'oiseaux :

- Les corbeaux peuvent consommer les graines en train de germer. Ils suivent en général la raie de semis.

→ Semez entre 3 et 5 cm de profondeur.

- Les perdreaux consomment toute la partie aérienne de la plantule. On peut quelquefois retrouver leurs excréments dans les places détruites.

- Les alouettes pincent le bourgeon terminal. Des fragments de cotylédons non consommés peuvent tomber à terre à côté de la plantule détruite.

→ Contre ces deux types de dégâts, aucun moyen de lutte n'est efficace. Semer des parcelles d'au moins 3 ou 4 ha diminue proportionnellement l'ampleur des dégâts.

- Dégâts de lapins ou de lièvres : ils ressemblent aux dégâts de perdreaux.

- BLE -

MALADIES :

- Dans la plupart des parcelles semées avant l'hiver, le piétin-verse, lorsqu'il est présent, a commencé de pénétrer dans la tige.

→ Une intervention sera désormais beaucoup moins efficace.

- La septoriose a nettement évolué depuis une semaine. Elle est souvent présente sur 4^e feuille et atteint la 3^e feuille dans 1 parcelle sur 5 dans le cadre du réseau CERESMAR. Une apparition de septoria nodorum est parfois observée.

- L'oïdium progresse lui aussi sur variétés sensibles : Hardi, Talent, Festival, Fidel, Camprémy, Arminda, et atteint quelquefois la 4^e, voire la 3^e feuille.

- La rouille brune est quelquefois signalée sur Talent, Camprémy, Top, Fidel, surtout dans le Cher et l'Indre. Quelques parcelles abritées portent déjà des symptômes sur 3^e feuille.

Conduite à tenir :

- Pas de traces de maladies sur 3^e feuille :

Cas le plus fréquent à l'heure actuelle.

→ Attendre et surveiller l'état de la 3^e feuille.

- Septoriose sur 3^e feuille :

→ Un traitement rapide s'impose sur les parcelles non traitées contre les maladies du pied. Pour le choix du produit, tenir compte des autres maladies éventuellement présentes : fusariose, oïdium, rouille brune.

- Septoriose seule : manèbe, mancozèbe (+ soufre éventuellement) ou produits plus complets.

- Septoriose + fusariose du pied : produits type BAVISTINE M, PELTAR, CERETAL, CERECCLAIR (éventuellement + soufre) ou produits plus complets.

- Si septoriose + oïdium : manèbe ou mancozèbe + soufre à 8 kg, ou produit plus complet.

- Si faible présence de rouille brune : DITHANE M 45 à 6 kg ou BLEDOR 3 (produits essentiellement préventifs).

- Si forte présence de rouille brune : produit polyvalent de haut niveau.